

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

AVEYRON, AUDE, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72 - C. C. P. 52 38 57

3ème Edition n° 8

4ème Edition n° 8

5ème Edition n° 7

27 Juin 1960

A V E R T I S S E M E N T S

CARPOCAPSE

Zones III, IV, V

Les récentes pluies et l'accroissement du volume des fruits rendent indispensable l'exécution d'un nouveau traitement avant le 2 Juillet.

TORDEUSE ORIENTALE

Zones III, IV

Les dégâts provoqués sur les fruits par la chenille de ce lépidoptère vont s'intensifier en fonction de leur maturité (abricots, pêches, poires et pommes) et aussi du fait de l'aoûtement des pousses.

Nous rappelons que la lutte requiert trois traitements réalisés à 8-10 jours d'intervalle.

Commencer la série des traitements sur les fruits devant être récoltés au cours de la 2ème quinzaine de juillet.

OIDIUM DU POMMIER

Zones III et V

La maladie persiste dans certains vergers (Conflent et Cévennes) Répéter les traitements en évitant l'emploi du Soufre qui peut provoquer des brûlures au cours des chaudes journées estivales.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Zones III et IV

La maladie peut prendre une extension très grave en raison de la température élevée et de l'humidité consécutive aux récentes pluies. Exécuter d'urgence un traitement.

LE CONTROLEUR

L'INSPECTEUR

LL. TROUILLON

P. BERVILLE

P 329